

Signes à surveiller

Si vous remarquez l'un des symptômes suivants, présentez-vous à l'urgence de votre hôpital ou communiquez avec votre urologue :

- du sang clair en quantité abondante, qui coule de la plaie plus de 24 heures après l'opération ou qui ne s'arrête pas après la compression conseillée de 10 minutes;
- une douleur de la zone opérée non soulagée par les médicaments;
- une fièvre de 38 °C (100,4 °F);
- l'apparition, 7 jours après la chirurgie, de signes d'infection de la plaie (rougeur, **augmentation** de l'enflure, chaleur, écoulement épais verdâtre).

Votre suivi

Rendez-vous au bureau du chirurgien dans :

4 semaines 6 semaines 8 semaines Au besoin

Clinique Médi-Soleil

Clinique d'urologie

Tél. : 579 709-5559, poste 1

Production

© CISSS de la Montérégie-Centre

Édition : septembre 2023

Code d'impression : 5021



Chirurgie urologique Circoncision enfant

Feuillelet d'information

La circoncision est une chirurgie mineure au cours de laquelle on enlève le prépuce d'un enfant pour découvrir le gland de son pénis.

En cas de douleur

Habituellement, l'enfant ressent peu de douleur après cette intervention et elle disparaît normalement après quelques jours.

Vous pouvez contrôler la douleur avec de l'acétaminophène (Tylenol®, Tempra®, etc.) ou de l'ibuprofène (Advil®), en fonction de la dose recommandée selon le poids de votre enfant. Vous pouvez aussi, au besoin, donner à votre enfant des médicaments plus puissants prescrits par le chirurgien. Cela peut être nécessaire pour quelques jours.

Le gland, maintenant à découvert, est souvent plus sensible pendant quelques semaines. Votre enfant sera probablement plus confortable s'il porte des vêtements amples et si vous ne lui mettez pas de couche, selon la situation.

Généralités

- Votre enfant devrait pouvoir uriner normalement après la circoncision.
- Votre enfant devrait pouvoir retourner à la garderie ou à l'école quelques jours après la circoncision.

Soins de la plaie

- Si votre enfant porte un pansement, vous devez le retirer après 24 heures. Si le pansement tombe de lui-même avant le délai, vous pouvez laisser la plaie à l'air libre.
- Il est possible que l'urologue vous demande d'appliquer sur la plaie un onguent antiseptique en vente libre.

- Les points de suture tomberont d'eux-mêmes au cours des 1 à 60 jours suivant la chirurgie. Si une suture tombe rapidement, vous n'avez pas à vous inquiéter, la plaie guérira d'elle-même.
- Il arrive que le pénis enfle ou présente une ecchymose (un bleu) dans les premiers jours, mais cela disparaîtra en moins de 2 mois.
- Un léger suintement de sang peut se produire au niveau de l'incision dans les premiers 7 jours. Normalement, le suintement cessera si vous appuyez fermement sur la région qui saigne avec un tampon de gaze ou un papier mouchoir propre pendant 10 minutes.
- Il pourrait aussi y avoir un écoulement jaunâtre entre les points de suture, dans les 2 à 3 semaines suivant la chirurgie.

Précautions à prendre

- L'enfant doit éviter les sports et l'éducation physique pendant les 2 semaines suivant la chirurgie.
- L'enfant peut prendre un bain ou une douche 24 heures après la chirurgie.
- L'enfant doit éviter de se baigner dans une piscine ou d'aller dans un spa pendant les 2 semaines suivant la chirurgie.
- Gardez la plaie propre et sèche en tout temps.