

Aide-mémoire dans la gestion du diabète Avant et après une coloscopie

La veille de l'examen

Prise de votre glycémie

- Aux heures habituelles de repas
- Avant le coucher

Médication

- Prenez votre médication pour le diabète (comprimés, injections et insuline) comme à l'habitude.
- Si vous prenez de l'insuline lente :
 - **Le matin** : prenez votre dose habituelle.
 - **Le soir** : prenez seulement **la moitié** de votre dose habituelle.

Le jour de l'examen

Prise de votre glycémie

- À votre réveil
- Avant votre départ de la maison

Médication

- **Ne prenez AUCUN** comprimé pour le diabète.
- **Ne prenez AUCUNE** insuline.
- Vous pouvez prendre votre injection d'Ozempic®, Trulicity® ou Victoza®.

Après l'examen

Médication

- Vous pouvez reprendre TOUTE votre médication pour le diabète selon votre horaire régulier, dès que vous recommencez à manger.
- **Ne prenez PAS de double dose.**

En tout temps



- Prenez votre glycémie si vous présentez des signes et symptômes d'hypoglycémie: **tremblements, transpiration, nausées, étourdissements, faiblesse, etc.**
- En cas d'hypoglycémie, vous pouvez prendre un liquide clair sucré (ex.: jus de pomme).

Pour toute question, veuillez communiquer avec l'infirmière du Service d'endoscopie, du lundi au vendredi, entre 8 h et 15 h 30.

Hôpital Charles-Le Moyne
450 466-5000, poste 2627

Hôpital du Haut-Richelieu
450 359-5000, poste 3750

En dehors des heures d'ouverture, appeler le 8-1-1.

Production : avril 2024

Code d'impression : 5134