

**Jetez les seringues utilisées à la poubelle si elles sont complètement vides.**

**Rapportez dans une pharmacie toutes les seringues si elles contiennent encore des médicaments pour destruction.**

#### Production

© CISSS de la Montérégie-Centre

Direction des soins infirmiers, qualité et évolution de la pratique

Édition : octobre 2020

Ces feuillets ont été produits en collaboration avec des patients-partenaires de la médecine de jour des réseaux locaux de services du Haut-Richelieu–Rouville et de Champlain.

Numéro 34346

# L'ANTIBIOTHÉRAPIE INTRAVEINEUSE AMBULATOIRE À DOMICILE



Ce document vous permettra de comprendre et d'appliquer la méthode d'administration d'antibiotique intraveineux direct (par seringue).

L'utilisation de l'antibiothérapie par intraveineux direct consiste à s'autoadministrer un médicament à l'aide d'une seringue en poussant soi-même sur le piston afin d'injecter le médicament en temps requis.

Cette méthode est sans aiguille et sans dilution.

### À éviter

Tout ce qui est susceptible d'endommager la tubulure.

- morsures d'animaux
- objets tranchants
- sources de chaleur
- efforts violents nécessitant l'utilisation du bras où se situe votre cathéter
- eau et humidité au niveau du pansement recouvrant le cathéter

### Lors du bain

Gardez le bras hors de l'eau. Le cathéter ne doit pas être trempé dans l'eau.

### Lors de la douche

Recouvrez le site de votre cathéter ainsi que la tubulure avec une bonne épaisseur de pellicule transparente de type *Saran Wrap*® ou avec un sac de plastique.

## Réseau local de services du Haut-Richelieu–Rouville

CLSC de la Vallée-des-Forts		
La semaine		
Saint-Jean-sur-Richelieu	8 h à 21 h	450 358-2578, p. 2500
Henryville	9 h à 12 h et 13 h à 15 h 30	450 299-2828
Richelieu	17 h à 20 h	1 450 658-7561, p. 4900
Centrale Info-Santé	20 h à 8 h	1 800 361-7073
Les fins de semaine et les jours fériés		
Saint-Jean-sur-Richelieu	8 h à 21 h	450 358-2578, p. 2500
Centrale Info-Santé	17 h à 8 h	1 800 361-7073

CLSC du Richelieu		
La semaine		
Richelieu	8 h à 20 h	1 450 658-7561, p. 4900
Saint-Césaire	8 h 30 à 16 h 30	450 469-0269
Centrale Info-Santé	20 h à 8 h	1 800 361-7073
Les fins de semaine et les jours fériés		
Saint-Jean-sur-Richelieu	8 h à 21 h	450 358-2578, p. 2500
Centrale Info-Santé	17 h à 8 h	1 800 361-7073

**NE PAS ADMINISTRER SI : rougeur, œdème, douleur au site ou écoulement lors de l'irrigation**

Heure d'administration : \_\_\_\_\_

Heure de la prochaine dose : \_\_\_\_\_

Il est important de consulter si vous notez :

- une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre;
- une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.
- de la diarrhée sévère et persistante (plus de 4 selles liquides par jour). Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex. : Imodium©) sans en parler d'abord à votre pharmacien ou votre médecin.
- des nausées ou vomissements qui persistent ou des crampes et des douleurs abdominales sévères.

### Réseau local de services de Champlain

450 466-5000, poste 2417

<b>CLSC Samuel-de-Champlain</b>	
<b>7 jours sur 7 (incluant les jours fériés)</b>	
8 h à 22 h	450 445-4452, p. 612579

<b>Centrale 24/7 (pour les usagers inscrit seulement)</b>
<b>La semaine</b>
21 h à 8 h
<b>Les fins de semaine et les jours fériés</b>
16 h à 22 h

### Matériel requis

- 1 seringue d'antibiotique
- 2 seringues de rinçage de solution saline (NACL 0,9 %)
  - 10 ml pour Picline
- 3 tampons d'alcool unidose

### Points importants

- Vérifiez, sur l'étiquette de l'antibiotique, que votre nom soit bien inscrit, que la date d'expiration soit bonne et que le nom du médicament soit exact.
- Sortez les seringues requises du réfrigérateur, un minimum de 60 minutes avant l'heure prévue d'administration, afin qu'elles soient à la température ambiante.
- Laissez réchauffer à la température ambiante sur une surface propre (ne pas réchauffer au four micro-ondes ou dans l'eau chaude).
- Conservez les seringues au réfrigérateur, en tout temps. Lors de déplacements, évitez les variations de température (ex. : utilisez une glacière).
- Vérifiez que le cathéter intraveineux soit bien en place dans la veine, qu'il n'y ait pas de rougeur, d'écoulement ou d'inflammation autour du site.

## Étapes à suivre l'administration de l'antibiotique intraveineux

1. Lavez vos mains et installez-vous sur une surface propre.
2. Ouvrez la pince de la tubulure du cathéter, s'il y a lieu.
3. Désinfectez avec un tampon d'alcool en frottant le bouchon du cathéter pendant 15 à 30 secondes.
4. Prenez la seringue de 10 ml de NaCl 0,9 %, expulsez l'air et retirez le capuchon.
  - Prenez la seringue.
  - Vissez-la au bouchon de la tubulure du cathéter.
  - Aspirez légèrement pour vérifier le retour de sang.
  - Injectez lentement la solution par petits coups, sans forcer.
  - Laissez un minimum de 1 ml dans la seringue pour éviter le blocage du cathéter.
  - Retirez la seringue en dévissant.
5. Désinfectez avec un tampon d'alcool en frottant le bouchon du cathéter pendant 15 à 30 secondes.
6. Prenez la seringue avec l'antibiotique et retirez le bouchon.
  - Vissez la seringue au bouchon du cathéter.
  - Injectez par petits coups l'antibiotique 1 ml à la fois (1 ml – arrêt – 1 ml – arrêt).
  - Retirez la seringue en dévissant lorsqu'il n'y a plus d'antibiotique.
7. Désinfectez avec un tampon d'alcool en frottant le bouchon du cathéter pendant 15 à 30 secondes.

8. Prenez la seringue de 10 ml de NaCl 0,9 %, expulsez l'air et retirez le capuchon.
  - Prenez la seringue.
  - Vissez-la au bouchon de la tubulure du cathéter.
  - Aspirez légèrement pour vérifier le retour de sang.
  - Injectez lentement la solution par petits coups, sans forcer.
  - Laissez un minimum de 1 ml dans la seringue pour éviter le blocage du cathéter.
  - Retirez la seringue en dévissant.
9. Fermez la ou les pinces, s'il y a lieu.
10. Remplacez la tubulure sous le filet, la pochette ou le bandage.

## Effets indésirables liés à l'antibiotique

Effets indésirables que vous pourriez noter (généralement légers à modérés) :

- Nausées
- Crampes abdominales
- Selles molles, diarrhées

Vous devez communiquer avec l'infirmière le plus rapidement possible pour :

- changer le pansement;
- réinstaller le cathéter court, par exemple lors d'un traitement d'antibiothérapie intraveineuse de plus de 96 heures.