

Angioplastie

Instructions en lien avec la médication

Instructions précises concernant vos médicaments, y compris les médicaments pour le diabète, les anticoagulants ou les allergies.

Si vous prenez:

■ de la *Warfarine*, également appelée *Coumadin*[®], *Xarelto* ou autres anti-coagulants:

Votre médecin traitant vous demandera de les arrêter avant l'examen (le nombre de jours dépend du type de médication que vous prenez). Il pourrait vous prescrire un autre médicament à prendre pendant cette période. Si votre médecin vous prescrit de l'héparine sous-cutanée: vous devez la cesser 24 heures avant votre examen.

■ des antiplaquettaires, tel que le *Plavix*:

Votre médecin traitant vous demandera de les cesser 5 jours avant l'examen.

■ de la *Metformine*, également appelée *Glucophage*:

Votre médecin traitant vous demandera de ne pas le prendre le matin de l'examen et 48 heures suivant celui-ci.

Si vous êtes allergique à l'iode, vous devez prendre la préparation de *Prednisone* et de *Benadryl* prescrite par le radiologiste.

Le reste de la médication usuelle doit être poursuivie normalement.

Le matin de l'examen

- ➔ Prendre un petit déjeuner léger.
- ➔ Raser les 2 aines (ceci peut être fait la veille).
- ➔ Présentez-vous en chirurgie d'un jour (CDJ) au 2^e étage, à 6 h 30, avec votre carte d'hôpital, votre carte d'assurance maladie et votre liste de médicaments à jour.
- ➔ Vous devez être disponible toute la journée.
- ➔ Ne pas oublier d'avoir un accompagnateur pour le retour à la maison.

Le déroulement de l'examen

L'ANGIOPLASTIE COMPREND 4 ÉTAPES PRINCIPALES:

- 1 Sous anesthésie locale, ponction de l'artère au niveau de l'aine. Insertion d'un cathéter qu'on dirigera jusqu'à l'artère obstruée.
- 2 Injection d'iode pour localiser le blocage.
- 3 Gonflement d'un ballonnet pour désobstruer l'artère.
- 4 Retrait du cathéter et compression du point de ponction.



Lors du gonflement du ballonnet, vous pouvez ressentir une douleur qui ne durera que quelques instants et qui s'interrompra dès que l'on dégonflera le ballonnet. Parfois, l'angioplastie est complétée par l'implantation d'une endoprothèse.

Qu'est-ce qu'une endoprothèse ou « stent » ?

Il s'agit d'un petit ressort métallique que l'on place à l'intérieur de l'artère, pour garder celle-ci ouverte. L'installation se fait en même temps que l'angioplastie, par le même orifice. Ce *stent* restera en place définitivement.

Y a-t-il des risques liés à l'angioplastie ?

Toutes interventions présentent certains risques dont vous devez être informé :

- Une réaction allergique aux produits de contraste iodés.
- Un saignement et/ou un hématome au site de ponction.
- Une infection du site de ponction
- La dissection de l'artère (dédoublingement de la paroi) : elle pourra être résorbée sur place, par l'implantation d'une endoprothèse.
- Une embolie (migration d'un caillot sanguin dans la circulation)

Retour à la maison

- Vous devez vous reposer 24 heures.
- Vous devez garder le pansement 24 heures. Il est important de ne pas mouiller celui-ci pour ne pas favoriser une infection.
- Vous ne devez pas conduire pendant les 24 premières heures.
- Vous ne devez pas effectuer d'exercices physiques intenses dans les 48 heures suivant l'angioplastie.

Contactez-nous immédiatement au **450 468-8111 poste 86495** si :

- Si vous saignez abondamment au site de ponction (en cas de saignement actif, allongez-vous et demandez à quelqu'un d'appuyer sur le site de ponction au niveau de l'aîne).
- Si vous avez des douleurs, une sensation de froid, une modification de la sensibilité ou un changement de couleur dans la jambe qui a subi la ponction artérielle.
- Si vous avez de la fièvre ou des frissons.

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Est

Québec



santeme.quebec



facebook.com/cissme



400-3551