

# Biopsie hépatique

## Instructions en lien avec la médication

Instructions précises concernant vos médicaments, y compris les médicaments pour le diabète, les anticoagulants ou les allergies.

### Si vous prenez:

#### ■ de la *Warfarine*, également appelée *Coumadin*<sup>®</sup>, *Xarelto* ou autres anti-coagulants:

Votre médecin traitant vous demandera de les arrêter avant l'examen (le nombre de jours dépend du type de médicament que vous prenez). Il pourrait vous prescrire un autre médicament à prendre pendant cette période. Si votre médecin vous prescrit de l'héparine sous-cutanée: vous devez la cesser 24 heures avant votre examen.

#### ■ des antiplaquettaires, tel que le *Plavix*:

Votre médecin traitant vous demandera de les cesser 5 jours avant l'examen.

Le reste de la médication usuelle doit être poursuivie normalement.

## Le matin de l'examen

- ➔ Prendre un petit déjeuner léger.
- ➔ Vous devez vous présenter en médecine de jour (MDJ) au 1<sup>er</sup> étage, à 7 h 30, avec votre carte d'hôpital, votre carte d'assurance maladie et votre liste de médicaments à jour.
- ➔ Vous devez être disponible toute la journée.
- ➔ Ne pas oublier d'avoir un accompagnateur pour le retour à la maison.

## Le déroulement de l'examen

LA BIOPSIE HÉPATIQUE COMPREND 3 ÉTAPES PRINCIPALES:

- 1 Sous guidage échographique, anesthésie locale de la région sélectionnée par le radiologiste.
- 2 Insertion de l'aiguille à prélèvement jusqu'à la région du foie choisie par le radiologiste. Puis prélèvement de 2-3 spécimens pour analyses en laboratoire.
- 3 Retrait de l'aiguille à biopsie, compression du point de ponction.



Lors de l'avancée de l'aiguille, vous pourrez ressentir un léger pincement qui ne durera qu'une fraction de seconde.

Lorsque le mécanisme de l'aiguille se déclenche, celui-ci produit un son ressemblant à celui d'une agrafeuse.

## Quel est le délai d'attente avant d'obtenir les résultats ?

Le délai d'attente pour les résultats de la biopsie hépatique est d'environ deux semaines. C'est votre médecin qui vous les communiquera.

## Y a-t-il des risques liés à la biopsie hépatique ?

**Toutes interventions présentent certains risques dont vous devez être informé :**

- Un saignement et/ou un hématome au site de ponction.
- Une douleur au site de ponction, à l'abdomen ou à l'épaule droite.
- Une infection du site de ponction.

## Retour à la maison

- Vous devez vous reposer 24 heures.
- Vous devez garder le pansement 24 heures.
- Vous ne devez pas conduire pendant les 24 premières heures.
- Vous ne devez pas effectuer d'exercices physiques intenses dans les 48 heures suivant la biopsie.

## Contactez-nous immédiatement au **450 468-8111 poste 86495** si :

- Si vous saignez abondamment au point de ponction (en cas de saignement actif, allongez-vous et demandez à quelqu'un d'appuyer sur la zone du saignement).
- Si vous constatez un changement de couleur, de température ou un écoulement anormal au niveau du site de ponction.
- Si vous avez des douleurs abdominales prolongées qui vont en augmentant.
- Si vous avez de la fièvre ou des frissons dans les 24 heures suivant l'examen.

Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
de la Montérégie-Est

Québec



santeme.quebec



facebook.com/cissme



400-3557