

Drainage d'un kyste

Instructions en lien avec la médication

Instructions précises concernant vos médicaments, y compris les médicaments pour le diabète, les anticoagulants ou les allergies.

Si vous prenez:

■ de la *Warfarine*, également appelée *Coumadin*®, *Xarelto* ou autres anti-coagulants:

Votre médecin traitant vous demandera de les arrêter avant l'examen (le nombre de jours dépend du type de médicament que vous prenez). Il pourrait vous prescrire un autre médicament à prendre pendant cette période. Si votre médecin vous prescrit de l'héparine sous-cutanée: vous devez la cesser 24 heures avant votre examen.

■ des antiplaquettaires, tel que le *Plavix*:

Votre médecin traitant vous demandera de les cesser 5 jours avant l'examen.

Si vous êtes allergique à l'iode, vous devez prendre la préparation de *Prednisone* et de *Benadryl* prescrite par le radiologiste.

Le reste de la médication usuelle doit être poursuivie normalement.

Le matin de l'examen

- ➔ Prendre un petit déjeuner léger.
- ➔ Vous devez vous présenter en médecine de jour (MDJ) au 1^{er} étage, à 7 h 30, avec votre carte d'hôpital, votre carte d'assurance maladie et votre liste de médicaments à jour.
- ➔ Vous devez être disponible toute la journée.
- ➔ Ne pas oublier d'avoir un accompagnateur pour le retour à la maison.

Le déroulement de l'examen

LE DRAINAGE D'UN KYSTE COMPREND 4 ÉTAPES PRINCIPALES:

- 1 Sous anesthésie locale, ponction du kyste, sous guidage échographique.
- 2 Insertion d'un cathéter dans le kyste afin d'opacifier (colorer) celui-ci. Cette étape n'est pas toujours nécessaire.
- 3 Prélèvement du contenu liquidien pour analyses en laboratoire.
- 4 Installation d'un pansement.

Qu'est-ce qu'un kyste ?

Un kyste est une cavité qui se remplit d'un liquide ou d'une substance semi-solide, qui se forme dans un organe ou un tissu, n'importe où sur le corps. La plupart des kystes sont bénins, mais certains peuvent perturber le fonctionnement d'un organe et/ou causer des douleurs.

Y a-t-il des risques liés au drainage kystique ?

Toutes interventions présentent certains risques dont vous devez être informé (évidemment les risques dépendent beaucoup de l'emplacement du kyste) :

- Un saignement et/ou un hématome au site de ponction.
- Une douleur au site de ponction.
- Une infection du site de ponction.

Retour à la maison

- Vous devez vous reposer 24 heures.
- Vous devez garder le pansement 24 heures.
- Vous devez éviter de mouiller le pansement pour ne pas favoriser l'apparition d'infection.

Contactez-nous immédiatement au 450 468-8111 poste 86495 si :

- Si une douleur apparaît ou augmente.
- Si vous avez de la fièvre ou des frissons dans les 24 heures suivant l'examen.

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Est

Québec



santeme.quebec



facebook.com/cisssme



400-3558