

- Portez le bandeau selon les recommandations du chirurgien.
- Les points fondants disparaîtront naturellement en quelques semaines.
- Portez une attention particulière aux engelures et aux coups de soleil, car la sensibilité des oreilles peut être diminuée durant la première année suivant la chirurgie.

Votre suivi

- Rendez-vous en cliniques externes de l’Hôpital Charles-Le Moyne
450 466-5000, poste 5054
 - 2 jours
 - 4 semaines
 - 6 semaines
- Bureau du chirurgien
 - 2 jours
 - 4 semaines
 - 6 semaines

Production

© CISSS de la Montérégie-Centre
Édition : octobre 2023

Code d’impression : 5049



Chirurgie de l’oreille (cure de prominauris)

Feuillelet d’information

Consignes générales

- Favorisez des activités légères pour le premier mois suivant la chirurgie.
- Gardez le pansement sec, propre et bien en place.
- Évitez d'introduire les doigts ou d'autres objets sous le pansement.

Pour les 3 mois suivant la chirurgie

- Évitez de porter une casquette.
- Évitez de mettre vos cheveux derrière vos oreilles.
- Évitez de porter un chandail avec un col serré. Au moment d'enfiler ce chandail, cela tirera sur vos oreilles.

En cas de douleur

- Il est normal de ressentir de la douleur surtout dans les premiers jours après la chirurgie.
- En cas de douleur, vous pouvez prendre 2 comprimés d'acétaminophène (Tylenol®) 500 mg toutes les 6 heures.
- Si votre santé le permet, vous pouvez aussi prendre 2 comprimés d'ibuprofène 200 mg (Advil®) toutes les 6 heures.
 - Si la douleur persiste, vous pouvez prendre les médicaments contre la douleur plus puissants, prescrits par votre chirurgien.

Reprise de la médication habituelle

Vous pouvez recommencer à prendre votre médication habituelle immédiatement à la suite de votre chirurgie. Par contre, ne prenez aucun médicament contenant de l'aspirine, à moins d'avis contraire de votre chirurgien.

En cas de saignement

- Couchez l'enfant et appuyez sur l'oreille qui saigne dans le but de créer une pression constante pendant 30 minutes.
- Si un saignement imbibé le pansement, délimitez le contour de la tache à l'aide d'un feutre afin de vous assurer qu'elle ne s'agrandit pas.
- Si le saignement reprend ou progresse, présentez-vous à l'urgence.

Signes à surveiller

Si vous remarquez l'un des signes suivants, présentez-vous à l'urgence :

- le pansement fait mal ou se défait;
- du sang qui coule de la plaie plus de 24 heures après l'opération;
- une douleur de la zone opérée non soulagée par les médicaments;
- Des signes d'infection de la plaie : rougeur, gonflement, chaleur, écoulement jaunâtre ou verdâtre ou une fièvre de 38 °C (100,4 °F).

Retrait du pansement

- Le chirurgien retirera votre pansement dans les 7 à 10 jours suivant la chirurgie.
- Présentez-vous à l'hôpital si le pansement tombe ou s'il se déplace.

Une fois le pansement retiré

- Lavez vos cheveux avec un shampoing doux.
- Nettoyez quotidiennement les oreilles et les cicatrices avec de l'eau et du savon doux.