

Votre suivi

Appelez à l'endroit désigné plus bas pour obtenir un rendez-vous de suivi dans :

- Aucun suivi nécessaire
- 10 à 14 jours
- 4 semaines
- 6 semaines
 - Cliniques externes de l'Hôpital Charles-Le Moyne
 - Cliniques externes de l'Hôpital du Haut-Richelieu

Coordonnées

Hôpital du Haut-Richelieu

900, boulevard du Séminaire Nord, bureau 210
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1B5
450 359-4293

Hôpital Charles-Le Moyne

3120, boulevard Taschereau
Greenfield Park (Québec) J4V 2H1
Cliniques externes
Tél. : 450 466-5000, poste 5054

Production

© CISSS de la Montérégie-Centre
Édition : mai 2024
Révision : décembre 2024

Code d'impression : 5017



Chirurgie à l'aine ou à l'aisselle

Feuillelet d'information

Vous avez subi une chirurgie à l'aîne ou à l'aisselle

- Hydradénite inguinale ou axillaire
- Retrait de ganglions sentinelles

Consignes générales

- À votre retour à la maison et pour les premières 48 heures, appliquez de la glace sur le site de la chirurgie pour une période de 15 minutes, toutes les 1 à 2 heures, selon votre tolérance.
 - Enveloppez votre sac de glace dans une débarbouillette pour ne pas qu'elle soit directement en contact avec votre peau.
- Bougez régulièrement le membre du côté opéré afin de diminuer l'enflure.

*Particularités relatives à une chirurgie inguinale (à l'aîne)

- Il est normal de constater la présence d'une ecchymose (un bleu) autour du scrotum ou à la base du pénis. Elle prendra quelques semaines avant de disparaître complètement.

Pour les 7 premiers jours après votre opération

- Évitez de forcer avec la partie du corps opérée.
- Évitez l'utilisation de crème, de lotion ou de déodorant sur votre plaie.

Pour les 14 premiers jours après votre opération

- Évitez les exercices intenses.
- Évitez de prendre un bain, d'aller dans un spa ou de vous baigner dans une piscine.

Reprise de la médication habituelle

- Vous pouvez recommencer à prendre votre médication habituelle immédiatement à la suite de votre chirurgie. Par contre, ne prenez aucun médicament contenant de l'aspirine, à moins d'avis contraire de votre chirurgien.

Soins de la plaie

- Retirez le pansement le : _____
- Retirez les diachylons de rapprochement le : _____
- Faites enlever les points de suture le : _____

Signes à surveiller

Si vous remarquez l'un des signes suivants, présentez-vous à l'urgence :

- un saignement important qui coule de la plaie plus de plus de 24 heures après l'opération;
- une douleur de la zone opérée non soulagée par les médicaments;
- des signes d'infection de la plaie : rougeur, gonflement, chaleur, écoulement jaunâtre ou verdâtre ou une fièvre de 38 °C (100,4 °F);
- une ouverture de la plaie.
- l'incapacité d'uriner durant une période de plus de 8 heures.