Tableau aide-mémoire pour le soulagement de la douleur suite à une chirurgie de remplacement du genou ou de la hanche

Écrivez l'heure que vous avez pris la médication

Médication	Informations	Jour 0	jour 1	jour 2	jour 3	jour 4	jour 5	jour 6	jour 7	Durée
Acétaminophène (Tylenol) Soulage la douleur légère à modérée, doit être pris régulièrement	Prendre à toutes les 6 heures									Pour 4 semaines
Célécoxib (Celebrex) Anti-inflammatoire qui diminue l'enflure et la douleur légère à modéré	Pendre au déjeuner et au souper									Pour 2 semaines
Tramadol (Ultram) Opiacé Soulage la douleur modérée	Prendre chaque 6 heures si besoin									Si douleur
Hydromorphone (Dilaudid) Morphine (Statex) Oxycodone (Supeudol) Opiacé Soulage la douleur intense	Prendre chaque ___ heures si besoin ou Si Ultram non efficace									Si douleur

Les informations contenues sur ce document ne sont pas une ordonnance. Suivez les consignes données par votre médecin ou votre pharmacien.

Les autres médicaments prescrits :

Rivaroxaban (Xarelto) ou ASA (Aspirine) : Prévention des caillots, à prendre à la même heure chaque jour pour toute la durée prescrite.

Pantoprazole (Pantoloc) : Protection de l'estomac, à prendre 30 minutes avant le déjeuner.

Polyéthylène glycol (Lax-A-Day) : Poudre laxative pour la prévention de la constipation, à prendre jusqu'au retour des selles normales ou pendant la durée de la prise d'opiacés. Cesser de prendre la poudre si les selles sont liquides.

Autre : _____

Autre : _____

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Est