

Code d'impression : 5369

Production

© CISSS de la Montérégie-Centre, 2025



La colposcopie et le retrait de lésions anormales

Information

Qu'est-ce que la colposcopie?

La colposcopie est un examen médical qui permet d'observer la vulve, le vagin et le col de l'utérus à l'aide d'un appareil appelé colposcope (un microscope spécial).

Cet examen est souvent fait après un test PAP (ou test de Papanicolaou) qui a donné un résultat anormal. Ces résultats peuvent être causés par une inflammation, une infection, un précancer ou un cancer du col de l'utérus.

L'examen peut être fait même pendant les règles, sauf si les saignements sont trop abondants.


Pour mieux comprendre les problèmes, le médecin peut faire :

- un frottis : prélèvement de cellules à la surface du col avec une petite brosse ou une spatule;
- une biopsie : prélèvement d'un petit morceau de tissu pour l'analyser.

Pendant l'examen, vous serez allongée comme pour un examen gynécologique habituel. Un spéculum sera doucement inséré dans le vagin pour permettre de bien voir le col de l'utérus.



© SantéBD



© SantéBD

« Les dessins utilisés dans ce livret proviennent de la banque d'images SantéBD. Ils sont la propriété de [Coactis Santé](#) et ont été créés pour les supports [SantéBD](#) qui expliquent la santé avec des images et des mots simples. Leur usage est libre dans la limite d'un usage non lucratif et à condition de citer la source et la propriété intellectuelle. Toute utilisation de ces dessins sur des supports à des fins commerciales est interdite. »

[illegible]

Après une colposcopie, vous pourriez avoir :

- des pertes vaginales brunâtres ou un saignement léger pendant quelques jours;
- des crampes légères au ventre pendant quelques heures, si vous avez eu une biopsie.

Que se passe-t-il si les résultats de la colposcopie sont anormaux?

Si des problèmes sont détectés, le médecin peut retirer les lésions de 2 façons :

- biopsie conique : enlever un petit morceau de tissu en forme de cône;
- LEEP : enlever un petit morceau de tissu en forme de cône, avec un fil métallique chauffé par un courant électrique.
- Il est possible que le médecin ait prévu de retirer l'endomètre (la couche interne de l'utérus) pour diminuer ou arrêter des saignements importants.

Déroulement du traitement

- Vous serez allongée comme pour un examen gynécologique.
- Un spéculum sera utilisé pour voir le col de l'utérus.
- Une anesthésie locale sera faite (injection d'un médicament au niveau du col de l'utérus) pour engourdir la zone et réduire la douleur. Vous resterez éveillée.
- Selon le traitement, vous pourriez recevoir un médicament pour vous détendre et un autre contre la douleur.

Important : Si vous recevez ces médicaments, vos réflexes seront diminués pendant 1 journée.

Pendant ce temps, il ne faut pas :

- conduire un véhicule;
- boire de l'alcool;
- prendre des décisions importantes ou signer des documents importants.

Références

CHUM (2021). Le traitement par anse diathermique (LEEP). <https://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/2021-06/140-2-le-traitement-par-anse-diathermique.pdf>

CIUSSS de l'Estrie (2021). Colposcopie. https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/soins-services/Specialises/Examens-tests/Gyneco-obstetrique/Feuillet_Colposcopie_FR2022.pdf

CIUSSS de l'Estrie (2022). Traitement par anse diathermique (LEEP). https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/soins-services/Specialises/Examens-tests/Gyneco-obstetrique/Feuillet-LEEP_VF.pdf

Passeport santé (2015). Définition de la colposcopie. <https://www.passeportsante.net/fr/Maux/examens-medicaux-operations/Fiche.aspx?doc=examen-colposcopie>

Société canadienne du cancer (2023). Résultats anormaux de la biopsie du col de l'utérus. <https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/cervical/diagnosis/abnormal-cervical-biopsy-results>

Vous avez des questions?

Hôpital du Haut-Richelieu
450 359-5000, poste 5101

Hôpital Charles-Le Moyne
450 466-5000, poste 2850

Après le traitement

Vous resterez en observation environ 30 à 60 minutes avant de pouvoir rentrer chez vous.

Que se passe-t-il après le retrait des lésions?

De retour à la maison, il est normal :

- d'avoir des pertes vaginales brunâtres pendant plusieurs jours;
- d'avoir des saignements, parfois abondants, pendant jusqu'à 1 mois;
- d'avoir des douleurs ou des crampes comme celles des règles pendant 1 ou 2 jours.



Pour soulager la douleur, vous pouvez prendre des médicaments comme l'ibuprofène ou l'acétaminophène.

Que faire après le retrait des lésions?

Il y a un risque d'infection de l'utérus, il faut donc éviter :

Pendant 3 semaines

- N'utilisez pas de tampon ou de coupe menstruelle. Utilisez plutôt des serviettes hygiéniques.
- N'utilisez pas de douches vaginales, de suppositoires ou de désodorisants vaginaux.
- Ne pas vous baignez dans une piscine ou un lac tant que vous avez des saignements de couleur rouge.

Pendant 2 semaines

- N'ayez pas de relations sexuelles avec pénétration (doigt, pénis, objets sexuels).

Quand consulter un médecin après l'examen?

Consultez un médecin si vous avez un des symptômes suivants :

- fièvre plus élevée que 38,5 °C (par la bouche);
- pertes vaginales qui sentent mauvais;
- saignements vaginaux plus abondants que vos règles (plus d'une serviette hygiénique maxi de nuit par heure);
- caillots de sang;
- douleur intense au ventre.



© SantéBD



© SantéBD



© SantéBD



© SantéBD