

La tuberculose active

La bactérie rend la personne **malade**. Elle touche **souvent** les **poumons**. Elle peut toucher d'autres organes du corps (par exemples : les reins, les os, les ganglions, le cerveau, etc.).



La **tuberculose active** est une **maladie qui peut être contagieuse** (que vous pourriez donner aux autres) et qui peut avoir des **problèmes très graves pour votre santé et celle de vos proches** (votre famille et vos amis).

Les principaux **signes** de la **tuberculose active** sont :

- Toux importante qui dure plus de 3 semaines
- Cracher du sang
- Fièvre et/ou frissons
- Être très fatigué
- Avoir moins faim
- Suer durant la nuit
- Perdre du poids
- Avoir mal dans la région des poumons (entre le cou et le ventre)

Si vous avez des signes de tuberculose active

Allez à l'urgence de l'hôpital :

- Portez un masque
- Apportez tous vos médicaments
- Apportez un de ces documents (si vous les avez) :
 - votre carte d'assurance maladie
 - le document du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)
 - une autre preuve d'assurance santé




La **tuberculose active** est une **maladie grave et à traitement obligatoire**. Il faut prendre plusieurs médicaments pendant au moins 6 mois.

ATTENTION

Les informations données ici ne remplacent pas les consignes d'un professionnel de la santé.

Centre intégré
de santé et de
services sociaux de
la Montérégie-Centre

Québec 



La tuberculose

Québec 

La tuberculose

La tuberculose est une maladie causée par une **bactérie**.

Elle passe d'une personne à une autre dans l'air, lorsque quelqu'un qui porte la maladie parle, chante ou tousse.

Il y a deux formes de tuberculose :

1. Tuberculose **latente**
2. Tuberculose **active**

La tuberculose latente

La bactérie est **inactive** (elle dort dans votre corps). Vous n'êtes **pas malade**. **Vous n'êtes pas contagieux**. La bactérie peut devenir active plus tard dans votre vie.

Si vous avez la forme de tuberculose **latente**, un professionnel de la santé doit évaluer votre situation. Un médicament pourrait vous être recommandé si nécessaire. Il réduira la possibilité de développer la **tuberculose active** plus tard dans votre vie.

Vous ne pouvez pas donner la tuberculose **latente** aux autres.

Tests

Il faut 2 tests pour savoir si vous avez la tuberculose **latente** :

- 1 Test sur la peau ou prise de sang



ET

- 2 Radiographie des poumons



Médicaments pour la tuberculose latente

Il existe plusieurs médicaments pour la tuberculose **latente**.

Les médicaments les plus utilisés sont **Rifampine (RIF)** ou **Isoniazide (INH)**.

Ces **médicaments fonctionnent bien** pour empêcher de développer la **tuberculose active** plus tard et protéger votre santé.

Si le traitement est recommandé par le professionnel de la santé :

1. Prise de médicaments tous les jours pendant 4 à 9 mois (selon le médicament).
2. Rendez-vous réguliers à la clinique.
3. Prise de sang (au besoin).

Les réactions possibles aux médicaments sont très rares. Elles vous seront expliquées.

